



BRONSKI (E15A.43014)

Info zaadfirma	Teeltinfo Bronski + advies
Vruchtgewicht	120 à 150 gram
Los of tros	tros
Stengeldichtheid	Belicht: start 2.5 naar 2.7 stengels/m ²
	Onbelicht: start 2.25 naar 2.5 stengels/m ²
Eindafstand	2.75 à 3.7 stengels/m ²
trossnoei	5
Onderstam	Maxifort of DRO141
	Toppen op 2 ^{de} blad
Teeltgebied	België, Nederland en Frankrijk

RASBESCHRIJVING:

Het plantmateriaal was wisselend van kwaliteit. De meeste planten werden op het 2^{de} blad getopt. In een aantal gevallen waren er toch teveel koplozen. Dit vraagt wat extra arbeid (aandacht). Het probleem stelt zich dan ook dat de tros die rond de koploze plant ontwikkelt, zwakker kan zijn (bonkje, onregelmatige tros). Bij een goed evenwicht, zijn er weinig misvormde vruchten.

Bij opschaling van een ras naar grote oppervlakten, moeten ook de plantenkwekers dit ras leren kennen. De planten zijn zeer lichtgevoelig, als er wat teveel blokken per m² staan, wordt de ontwikkeling van de 1^{ste} tros duidelijk zwakker.

De teelten die opgestart zijn half december, zijn eerder “open” van opbouw. De planten hadden de neiging om te rekken. De ingestelde stooktemperatuur moest afgelopen december maand zeer laag staan om de tros te laten ontwikkelen. Er werden een aantal dagen met minder dan 75 joules/cm²/dag genoteerd. Dit in combinatie met weinig bladeren onder de 1^{ste} tros maakt het moeilijk een goede tros te ontwikkelen. Als de tros te laag zit, is het toch beter die te verwijderen.

Januari planters groeien “voller” weg. 2^{de} helft van januari was er wel een “stevige” lichthoeveelheid. In die gevallen was het eerder noodzakelijk een blaadje weg te nemen uit de kop van de plant. Het aantal bloemen per tros is vrij hoog +/- 7.



Lycopersicon

Een voornacht (+/- 15°C) helpt om het aantal bloemen per tros op niveau te houden. Indien goed gesnoeid (lees:5) dan zal er steeds voldoende bloem zijn. Bij ruimere kopafstanden moet de ingestelde nachttemperatuur niet te laag zijn. Het gewas is tijdens de aanvangsfase teelt, eerder “vol”. Het wordt aangeraden vanaf trosbloei 3 een blaadje in de kop te verwijderen. Voor plantingen van 15/1 zal dit eerder vanaf trosbloei 1 reeds zijn om het vol af te leiden naar de trosontwikkeling.

Tijdens de licht rijkste periode van het jaar (mei-juli) wordt blad uit de kop wegnemen, week na week ingeschat. Elk bedrijf is anders. De “groene vingers” bepalen wat er moet gebeuren.

ZWAKKE/STERKE PUNTEN:

- Gevoelig voor *Macrolophus* (*Nesidiocorus*) prikschade.
- Gevaar voor bolvormige trossen (klompjes), in dat verband wordt op 6 snoeien afgeraden!
- De doorkleuring verloopt vlot
- Arbeidsvriendelijk ras.

TEELTTIPS:

- Het is beter een stevig tempo aan te houden, qua stookpatroon. Het ras moet niet hyper nauw geteeld worden. De voornacht moet niet te laag staan, kort zijn. Een stevige minimum buis zorgt voor een snellere uitgroei duur. De ochtend moet niet te laag zijn, dat kan te “korte” trosstelen en klompvorming in de hand werken.
- Beugelen heeft de voorkeur op schrapen.
- Opletten voor een vegetatieve inslag bij het inwortelen, mogelijks worden daar de eerste bolvormige trossen gevormd.

Februari 2024 Lycopersicon.