



## BRIOSO

Info zaadfirma	<u>BRIOSO RZ F1 (72-130)   Rijk Zwaan NL</u>
Vruchtgewicht	36 à 42 gram
Los of tros	tros
Stengeldichtheid	Belicht: start 2.7 naar 3.7 à 4.2 stengels/m <sup>2</sup>
	Onbelicht: start 2.5 naar 3.7 stengels/m <sup>2</sup>
trossnoei	8 à 10
Onderstam	Maxifort, Kaiser
	Getopt geënte planten
Teeltgebied	Europa

### RASBESCHRIJVING:

Brioso kenmerkt zich als een sterk, vol groeiend gewas, dat vlot sterke scheuten maakt. De gewaskleur is vrij donker met grote bladschijven. Als onderstam mag een iets generatievere onderstam gekozen worden. Wanneer gekozen wordt voor driekoppers, dan kan DRO141 als onderstam gekozen worden. Er moet generatief gestuurd worden om te voorkomen dat de bladeren te lang worden. Het gewas kan te vol worden, wat als gevolg heeft dat de trossen minder goed uitgroeien. Een blad uit de kop weghalen is nodig en kan afhankelijk van het planttype, reeds nodig zijn vanaf de eerste tros. Dit helpt om het gewas open te houden. Vanaf half juli is het aan te raden regelmatig een blad uit de buik te halen. De teeltlijn bestaat uit een matig diepe voornacht (14°C) om voldoende knoppen aan te leggen. Het gewas kan veel water verdampen. Er moet voldoende vocht afgevoerd worden tijdens de dag om generatief te sturen. Het is nodig om het ras het gehele jaar door te snoeien. Rustig opbouwen bijvoorbeeld: 7 – 8 – 9 en eventueel een periode op 10. Maar er zouden continu 3 echte bloemen weggesnoeid moeten worden. Indien men te snel naar eindafstand gaat, wordt er fel ingeleverd op grofheid.

### ZWAKKE PUNTEN:

- Scheurgevoeligheid bij mindere zetting en weersvergangen. Bij cocktails moet een % gescheurde aanvaard worden (2% is normaal!).

### TEELTTIPS:

- Voldoende energie, vroeg in het seizoen, is nodig om grofheid te maken. In het begin moet snel geteeld worden (hoge dagtemperatuur) om strekking te maken.
- Tijdens de zomer kan met weinig energie-input een mooi evenwicht bereikt worden. Er moet in dat geval ruim gelucht worden (lage ventilatietemperatuur instellingen).



## Lycopersicon

- 10 bladeren in de zomer bij stengeldichtheid 4.2 stengels/m<sup>2</sup> is ruim voldoende.
- Kan zéér goed weg met hoge CO<sub>2</sub>-niveau's.
- Na het toppen moet er vlot blad worden weggehaald, aangezien het blad zeer groot kan worden waardoor er te weinig licht op de vruchten valt.
- Is een minder Botrytis-gevoelig ras maar bladsnijden heeft de voorkeur op breken.

Lycopersicon.